LISTA DE *MEMBRACIDAE* ENCONTRADOS EN LA ARGENTINA Y ALGUNOS PAISES LIMITROFES

por

JORGE R. CHRISTENSEN, Ing. Agr.

El estudio de los Homópteros auquenorrincos es indispensable para los que tienen interés en la Entomología Agrícola.

El primer paso es conocer cuáles son las familias, géneros y especies representadas en nuestro país, a fin de iniciar seguidamente los estudios que demostrarán la mayor o menor peligrosidad de cada uno de ellos.

Las lesiones producidas por estos insectos no suelen ser de importancia económica tal que justifiquen su estudio detallado, pero como entre ellos existen algunos que son transmisores de enfermedades y éstas sí tienen importancia económica se hace imprescindible su conocimiento sistemático y ecológico.

Por estos motivos y por el desconocimiento casi absoluto que existe en el país sobre los Membrácidos he creído conveniente y necesario dar a publicidad estos pocos datos reunidos por mí, ya que aunque sólo sirvieran para abrir un nuevo horizonte a los entomólogos del país tendrían gran utilidad.

No se trata de un trabajo completo, sólo es y pretende ser una primera y breve comunicación sobre este importante punto.

Varios de los *Membracidae* mencionados fueron coleccionados por mí, pero en su mayoría, pertenecen a las colecciones de Carlos A. Lizer y Trelles, Everard E. Blanchard y Juan M. Bosq a quienes agradezco la amplia colaboración prestada.

He tomado también la lista que H. Box publicada en la Revista de la Estación Experimental Agrícola de Tucumán hace ya varios

años, no creo que de la acumulación de estas dos fuentes surjan discrepancias, ya que en los dos casos el material fué clasificado por el Dr. W. D. Funkhouser, de la Universidad de Kentucky, U.S.A.

SUBFAMILIA: *MEMBRACINAE*

GENERO: *Campylenchia,* Stäl

Campylenchia hastata (Fabricius), Tucumán, 1928, H. E. Box.

GENERO: *Pterygia,* Laporte

Pterygia satanas, Less, Andalgalá Catamarca, Rep. Arg.
Pterygia rubicunda (Buckt). Andalgalá, Catamarca, Rep. Arg.
Pterygia bituberculata, Fowler, Barranqueras, Chaco, Rep. Arg.

GENERO: *Bolbonota,* Amyot et Serville

Bolbonota pictipennis, Fairm. Corrientes, San Roque, Rep. Arg.
Bolbonota inaequalis, Fuhr. Corrientes, San Roque, Rep. Arg.

GENERO: *Erechtia,* Walker

Erechtia anmaculata Funkh. San Juan, Rep. Arg.

GENERO: *Leioscyta* Fowler

Leioscyta cornutula Stäl. Tucumán, XII-1927, I-1928, sobre *Acacia lorentzi,* (H. E. Box).

GENERO: *Enchenopa,* Amyot et Serville

Enchenopa monoceros Germar. Tucumán, XII-1927, I-1928 (H. E. Box).
Enchenopa apiculis Stäl. Anta, Salta, Rep. Arg.
Enchenopa sericea Walk. San Javier, Córdoba, Rep. Arg. sobre *Caesalpinia gilliesii.*
Enchenopa albidorsa Fairm. Rep. Arg.

GENERO: *Hypsoprora,* Stäl

Hypsoprora coronata (Buckt). Catamarca, Formosa, Corrientes, Tucumán, Chaco, Rep. Arg.

GENERO: *Spongophorus,* Fairmaire

Spongophorus paradoxa Germ. Coroico, Bolivia.

GENERO: *Membrascis,* Fabricius

Membrascis foliata Linn.
Membrascis c-album Fairm. Según Goding es igual a *foliata*. Salta, Rep. Arg.
Membrascis tectigera Oliv. Chulimani, Chilca, Bolivia.
Membrascis arcuata De Geer. Jujuy, Rep. Arg.
Membrascis peruviana Fairm. Minas, Brasil.

SUBFAMILIA: *HOPLOPHORINAE,* STAL

GENERO: *Metcalfiella,* Goding

Metcalfiella corrosum Fairm. Tucumán.

GENERO: *Alchisme,* Kirkaldy

Alchisme proyecta Funkh. Valle San Lorenzo, Salta.
Alchisme grossa Fairm. Caranavi, Bolivia.
Alchisme obscura Walker. Tucumán, VI-VIII-1927, sobre *Cestrum* sp. (H. E. Box).

GENERO: *Smiliorhachis,* Fairmaire, Stäl

Smiliorhachis proxima Berg. Tucumán. 1-128, sobre *Acacia lorentzi.* (H. E. Box).

SUBFAMILIA: *DARNINAE.* STAL

GENERO: *Aconophora,* Fairmaire

Aconophora femoralis Stäl. Tucumán, Rep. Arg.
Aconophora fusciformis Fowl. Tucumán, Rep. Arg.
Aconophora pinguis Fowl. Tucumán, Rep. Arg.
Aconophora projecta Funkh. Tucumán, VI-1914 (A. H. Rosenfeld). V-1918 (E. W. Rust), VI-1927, I-1928, sobre *Acacia lorentzi* (H. E. Box).

Aconophora pugionata, Germar. Tucumán VI-1927-I-1928, sobre *Acacia macrocantha* y *A. Lorenzi.* (H. E. Box).
Aconophora sinanjensis, Fowler. Tucumán VI-1914, (A. H. Rosenfeld); V-1918, (E. W. Rust), VI-1927, (H. E. Box).

GENERO: *Stictopelta,* Stäl

Stictopelta praecox, Burm. Catamarca.
Stictopelta indeterminata, Butler. Catamarca.
Stictopelta fraterna, Butler. Posadas, Misiones.
Stictopelta latilinea, Walk. Bs. As. Tigre, Catamarca.
Stictopelta acutula Fairm. Cerro Largo, Chaco, Salta, etc.
Stictopelta cruentata, Burm. Santiago del Estero.

GENERO: *Hemikyptha,* Metcalf.

Hemikyptha marginata, Fabricius. Río Yuneara. Bolivia.

GENERO: *Heteronotus,* Laporte.

Heteronotus quadrinodosus, Fairm. Trinidad, Bolivia.

GENERO: *Kronides* Kirkaldy.

Kronides cochleata, Schmidt. Corrientes, Tigre, Arg., Minas, Brasil.

GENERO: *Sundarion,* Kirkaldy

Sundarion flavomarginata, Fairm. Anta, Salta, Rep. Arg. Tucumán, XI[I]-1917-1-1928, sobre *Acacia macrocantha* (H. E. Box).
Sundarion brunniventris, (Fairm.) Yacanto, Córdoba, Rep. Arg.
Sundarion bimaculata, Fairmaire. Según C. Berg, pertenece al género *Pyranthe,* Stäl). Tucumán VI-1927, (H. E. Box).
Sundarion xanthographa, Germ. Metán, Salta, Rep. Arg.
Sundarion apicalis, Germar. Según C. Berg, pertenece al género *Hemiptycha,* Germar). Tucumán XII-1927, (H. E. Box).

GENERO: *Ictaranthe* Fowler

Ictaranthe latifrons, Fowler, Córdoba, Rep. Arg.

SUBFAMILIA: *SMILIINAE*

GENERO: *Dioclophara,* Kirkaldy

Dioclophara mixta, Stäl, Coroico, Nor Jungas, Bolivia.

GENERO: *Stictolobus,* Metcalf

Stictolobus maculatus, (Funkh.), Tte. Brown, Chaco, Rep. Arg. La Mendieta, Jujuy, I-1928, (H. E. Box).

GENERO: *Micrutalis,* Fowler

Micrutalis malleifera, Fowler. Buenos Aires, Rep. Arg.
Micrutalis pallens, Fowler. Yacanto, Córdoba, Rep. Arg.
Micrutalis ephippium, Burm. (*Acutalis variabilis,* Berg.) Rep. Arg., Tucumán, III-1913. (A. H. Rosenfeld), VI-1927 (H. E. Box).

GENERO: *Euritia,* Stäl

Euritia albifasciata, Funkh. Capiazutti, Salta, Rep. Arg.

GENERO: *Ceresa,* Amyot et Serville.

Ceresa extensa, (Walker) syn. *pauperata,* Berg. Tucumán IV-V-1913, abundante sobre alfalfa (H. A. Rosenfeld).
Ceresa malina, Germ. Tigre. Buenos Aires, Rep. Arg.
Ceresa concinna, Fowl. Catamarca, Rep. Arg .
Ceresa vitulus, Fabr. La Rioja, Rep. Arg.
Ceresa ustulata Fairm. Chaco, Córdoba, Corrientes, Rep. Arg.
Ceresa bifasciata, Spin. La Rioja, Corrientes, Catamarca, Rep. Arg., Tucumán V-VI-1927, (H. E. Box).
Ceresa axillaris, Germ. Andalgalá, Rep. Arg. Tucumán I-1928, San Pedro de Jujuy, 1928, (H. E. Box).
Ceresa brunnicornis Germ. Andalgalá, Tucumán, Córdoba, Bs. As., R. A. Caranavi, Nor Jungas, Bolivia. Tucumán V-VI-1927, (H. E. Box).

GENERO: *Gelastogonia,* Kirkaldy

Gelastogonia erythropus, Burm. Corrientes, Rep. Arg.

GENERO: *Entylia,* Germar.

Entylia gemmata, Germar. Bs. As., Chaco, etc.

GENERO: *Cyphonia,* Laporte

Cyphonia clavata, Fabr. San Roque, Corrientes, Rep. Arg.
Cyphonia ancoralis, Berg. Bs. As., Tigre, Formosa, Corrientes, Tu-

cumán, Paraná. Tucumán III-1918, (E. W. Rust) VI-1927, sobre *Baccharis medulosa* (H. E. Box). Sobre *Citrus* Paraná.

Cyphonia fuscata, Buckt. Isla Martín García.

Cyphonia proxima Guer. Capiazutti, Salta.

SUBFAMILIA: *TRAGOPINAE,* STÄL

GENERO: *Horiola,* Fairmaire

Horiola picta, (Cvg.). Cuatro ojos, Bolivia.

Mendoza, Marzo de 1941.